

# 2. KVADRATNE JEDNADŽBE

## 2.1. Kvadratna jednačba

	Oblici jednačbe	Riješenja
br.1	$ax^2 + bx + c = 0$	$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
br.2	$ax^2 + bx = 0 \quad c = 0$	$x_1 = 0 \quad , \quad x_2 = -\frac{b}{a}$
br.3	$ax^2 + c = 0 \quad b = 0$	$x_1 = +\sqrt{-\frac{c}{a}} \quad , \quad x_2 = -\sqrt{-\frac{c}{a}}$

### Primjeri:

Ovaj zadatak možemo rješavati na dva načina ili po br.3 ili načinu koji ću prvo pokazati . . .

sada taj isti zadatak riješen po br.3

$$1.) \quad 4x^2 - 25 = 0$$

$$4x^2 = 25 \quad / : 4$$

$$x^2 = \frac{25}{4} \quad / \sqrt{\quad}$$

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{25}{4}}$$

$$x_{1,2} = \pm \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}}$$

$$x_{1,2} = \pm \frac{5}{2}$$

$$x_1 = \frac{5}{2} \quad x_2 = -\frac{5}{2}$$

$$4x^2 - 25 = 0$$

$$a = 4 \quad , \quad b = 0 \quad , \quad c = -25$$

$$x_1 = +\sqrt{-\frac{c}{a}} \quad , \quad x_2 = -\sqrt{-\frac{c}{a}}$$

$$x_1 = \sqrt{-\frac{-25}{4}} \quad x_2 = -\sqrt{-\frac{-25}{4}}$$

$$x_1 = \sqrt{\frac{25}{4}} \quad x_2 = -\sqrt{\frac{25}{4}}$$

$$x_1 = \frac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}} \quad x_2 = -\frac{\sqrt{25}}{\sqrt{4}}$$

$$x_1 = \frac{5}{2} \quad x_2 = -\frac{5}{2}$$

iz dobivenih rješenja vidimo da obadva načina daju iste rezultate po mojim iskustvima češće se koristi prvi način

prvi način

$$2.) \quad x^2 + 1 = 0$$

$$x^2 = -1 \quad / \sqrt{\quad}$$

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{-1} \quad \sqrt{-1} = i$$

$$x_{1,2} = \pm i$$

$$x_1 = i \quad x_2 = -i$$

drugi način

$$x^2 + 1 = 0$$

$$a = 1 \quad , \quad b = 0 \quad , \quad c = 1$$

$$x_1 = +\sqrt{-\frac{c}{a}} \quad , \quad x_2 = -\sqrt{-\frac{c}{a}}$$

$$x_1 = \sqrt{-\frac{1}{1}} \quad x_2 = -\sqrt{-\frac{1}{1}}$$

$$x_1 = \sqrt{-1} \quad x_2 = -\sqrt{-1}$$

$$x_1 = i \quad x_2 = -i$$

dalje radim samo po prvom načinu

$$3.) \quad x^2 - 3 = 0$$

$$x^2 = 3 \quad / \sqrt{\quad}$$

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{3}$$

$$x_1 = \sqrt{3} \quad x_2 = -\sqrt{3}$$

$$4.) \quad \frac{x^2}{3} - 0.48 = 0 \quad / \cdot 3$$

$$x^2 - 1.44 = 0$$

$$x^2 = 1.44 \quad / \sqrt{\quad}$$

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{1.44}$$

$$x_{1,2} = \pm 1.2$$

$$x_1 = 1.2 \quad x_2 = -1.2$$

$$5.) \quad 4x^2 - 0.81 = 0$$

$$4x^2 = 0.81$$

$$4x^2 = \frac{81}{100} \quad / : 4$$

$$x^2 = \frac{81}{400} \quad / \sqrt{\quad}$$

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{81}{400}} = \pm \frac{\sqrt{81}}{\sqrt{400}}$$

$$x_{1,2} = \pm \frac{9}{20}$$

$$x_1 = \frac{9}{20} \quad x_2 = -\frac{9}{20}$$

$$6.) \quad 2x^2 + 1 = 0$$

$$2x^2 = -1 \quad / :$$

$$x^2 = -\frac{1}{2} \quad / \sqrt{\quad}$$

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{-\frac{1}{2}} = \pm \sqrt{\frac{1}{2} \cdot (-1)} =$$

$$= \pm \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{-1} = \pm \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot i$$

$$x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot i = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} i$$

$$x_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} i \quad x_2 = -\frac{\sqrt{2}}{2} i$$

$$\sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Ovo **NISU SVI zadaci**, već naš izbor pojedinih zadataka iz naše skripte potpuno riješenih zadataka iz poglavlja KVADRATNE jednačbe po školskoj zbirci! – ( za gimnazije ) cijelu skriptu o KVADRATNIM JEDNAČBAMA potpuno riješenih zadataka po školskoj zbirci možete kupiti kod nas - po cijeni od 99 kn narudžbe na mail: [mim-sraga@zg.htnet.hr](mailto:mim-sraga@zg.htnet.hr) ili na 01-4578-431 ili [www.maat-fiiz.com](http://www.maat-fiiz.com)

3.

$$\begin{aligned}
 1) \quad & 3x^2 + x = 0 \\
 & x(3x + 1) = 0 \\
 & x = 0 \quad 3x + 1 = 0 \\
 & x_1 = 0 \quad 3x = -1 / : 3 \\
 & \quad \quad x = -\frac{1}{3} \quad x_2 = -\frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad & \frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{3}x = 0 \\
 & x\left(\frac{1}{2}x - \frac{2}{3}\right) = 0 \\
 & x = 0 \quad \frac{1}{2}x - \frac{2}{3} = 0 \\
 & x_1 = 0 \quad \frac{1}{2}x = \frac{2}{3} / \cdot 2 \\
 & \quad \quad x = \frac{4}{3} \\
 & \quad \quad x_2 = \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad & x^2\sqrt{2} - x\sqrt{8} = 0 \\
 & x(x\sqrt{2} - \sqrt{8}) = 0 \\
 & x = 0 \quad x\sqrt{2} - \sqrt{8} = 0 \\
 & x_1 = 0 \quad x\sqrt{2} = \sqrt{8} / : \sqrt{2} \\
 & \quad \quad x = \frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} \\
 & \quad \quad x = \sqrt{\frac{8}{2}} \\
 & \quad \quad x = \sqrt{4} \\
 & \quad \quad x = 2 \\
 & \quad \quad x_2 = 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4) \quad & \frac{1}{2}x^2 + 6x = 0 \\
 & x\left(\frac{1}{2}x + 6\right) = 0 \\
 & x = 0 \quad \frac{1}{2}x + 6 = 0 \\
 & x_1 = 0 \quad \frac{1}{2}x = -6 / \cdot 2 \\
 & \quad \quad x = -12
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5) \quad & \frac{2}{3}x^2 - \frac{3}{4}x = 0 \\
 & x\left(\frac{2}{3}x - \frac{3}{4}\right) = 0 \\
 & x = 0 \quad \frac{2}{3}x - \frac{3}{4} = 0 \\
 & x_1 = 0 \quad \frac{2}{3}x = \frac{3}{4} / \cdot \frac{3}{2} \\
 & \quad \quad x = \frac{9}{8} \\
 & \quad \quad x_2 = \frac{9}{8}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6) \quad & x^2 = x \\
 & x^2 - x = 0 \\
 & x(x - 1) = 0 \\
 & x = 0 \quad x - 1 = 0 \\
 & x_1 = 0 \quad x = 1 \\
 & \quad \quad x_2 = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7) \quad & 0,04x^2 + 5x = 0 \\
 & x(0,04x + 5) = 0 \\
 & x = 0 \quad 0,04x + 5 = 0 \\
 & x_1 = 0 \quad 0,04x = -5 / : 0,04 \\
 & \quad \quad x = -\frac{5}{0,04} \\
 & \quad \quad x = -125 \\
 & \quad \quad x_2 = -125
 \end{aligned}$$

## 2.2. Rješenja kvadratne jednadžbe

1.

Primjeri:

ZA RAZUMIJEVANJE OVOG ZADATKA I SAMO RJEŠAVANJE POTREBNO JE DOBRO POZNAVANJE ALGEBARSKIH IZRAZA TO JE GRADIVO SA POČETKA PRVOG RAZREDA

1.)  $x^2 - 2x - 3 = 0$  sada kažemo  $A^2 = x^2$  i  $2AB = -2x$  iz te dvije pretpostavke izračunamo  $A$  i  $B$

$$\begin{array}{r} \downarrow \quad \downarrow \\ A^2 \quad 2AB \end{array}$$

$$A^2 = x^2 \quad / \sqrt{\quad}$$

$$A = x \quad \text{sada to uvrstimo u} \quad \begin{array}{l} 2AB = -2x \\ 2xB = -2x \quad / : 2x \\ B = -1 \end{array}$$

dobili smo  $A = x$  i  $B = -1$ , postavimo  $(A + B)^2$

$$(A + B)^2 = (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1 \quad \text{prva dva člana su ista kao i u početku jednadžbe ali treći član (+1) je broj koji trebamo dodati i oduzeti od početne jednadžbe}$$

pišemo  $x^2 - 2x + 1 - 1 - 3 = 0$  dodam i oduzmem jedan  $-1 + 1 = 0$

$$\begin{array}{r} \underbrace{\hspace{1.5cm}} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}} \\ (x-1)^2 - 4 = 0 \end{array}$$

$$(x-1)^2 - 2^2 = 0 \quad \rightarrow$$

$$(x-1-2) \cdot (x-1+2) = 0$$

$$(x-3) \cdot (x+1) = 0$$

$$x-3 = 0 \quad x+1 = 0$$

$$x_1 = 3 \quad x_2 = -1$$

to ne mijenja jednakost

sada prva tri člana prikazem kao kvadrat binoma a preostala dva člana zbrojim

kada se bolje pogleda lijeva strana jednakosti vidljivo je da je to razlika kvadrata

2.)  $x^2 - 4x - 5 = 0$

$$A^2 = x^2 \quad / \sqrt{\quad}$$

$$A = x \quad \rightarrow \quad 2AB = -4x$$

$$2xB = -4x \quad / : 2x$$

$$A = x \quad B = -2$$

$$(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4 \quad \rightarrow \downarrow$$

dodajemo i oduzimamo 4

$$x^2 - 4x - 5 = 0$$

$$x^2 - 4x + 4 - 4 - 5 = 0$$

$$\begin{array}{r} \underbrace{\hspace{1.5cm}} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}} \\ (x-2)^2 - 9 = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A^2 \quad - \quad B^2 \\ (x-2)^2 - 3^2 = 0 \end{array}$$

$$(A - B) \cdot (A + B)$$

$$(x-2-3) \cdot (x-2+3) = 0$$

$$(x-5) \cdot (x+1) = 0$$

$$x-5 = 0 \quad x+1 = 0$$

$$x = 5 \quad x = -1$$

$$x_1 = 5 \quad x_2 = -1$$

3.)  $x^2 - 6x + 13 = 0$

$$A^2 = x^2 \quad / \sqrt{\quad}$$

$$A = x \quad 2AB = -6x$$

$$2xB = -6x \quad / : 2x$$

$$B = -3$$

$$(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$$

dodajemo i oduzimamo 9

$$x^2 - 6x + 9 - 9 + 13 = 0$$

$$(x-3)^2 + 4 = 0$$

$$(x-3)^2 = -4 \quad / \sqrt{\quad}$$

$$\sqrt{(x-3)^2} = \sqrt{-4}$$

$$x-3 = \pm \sqrt{4} \cdot \sqrt{-1}$$

$$x-3 = \pm 2i$$

$$x-3 = 2i \quad x-3 = -2i$$

$$x = 3 + 2i \quad x = 3 - 2i$$

$$x_1 = 3 + 2i \quad x_2 = 3 - 2i$$

## Zadaci:

1)  $x^2 - 4x + 3 = 0$

$$A^2 = x^2 / \sqrt{\quad} \rightarrow 2AB = -4x$$

$$A = x \quad 2 \cdot xB = -4x / : 2x$$

$$B = -2$$

$$(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$$

dodajemo i oduzimamo 4

$x^2 - 4x + 3 = 0$

$$x^2 - 4x + 4 - 4 + 3 = 0$$

$$\underbrace{(x-2)^2} - 1 = 0$$

$$A^2 - B^2 =$$

$$(x-2-1) \cdot (x-2+1) = 0$$

$$(x-3)(x-1) = 0$$

$$x-3=0 \quad x-1=0$$

$$x=3 \quad x=1$$

$$x_1=3 \quad x_2=1$$

2)  $x^2 + 2x - 8 = 0$

$$A^2 = x^2 / \sqrt{\quad} \quad 2AB = 2x$$

$$A = x \quad 2xB = 2x / : 2x$$

$$B = 1$$

$$(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$$

dodajemo  
i oduzimamo 1

$x^2 + 2x - 8 = 0$

$$\underbrace{x^2 + 2x + 1} - 1 - 8 = 0$$

$(x+1)^2 - 9 = 0$

$(x+1)^2 - 3^2 = 0$

$(x+1-3)(x+1+3) = 0$

$(x-2)(x+4) = 0$

$$x-2=0 \quad x+4=0$$

$$x=2 \quad x=-4$$

$$x_1=2 \quad x_2=-4$$

3)  $4x^2 - 4x - 3 = 0$

$$A^2 = 4x^2 / \sqrt{\quad} \quad 2AB = -4x$$

$$A = 2x \quad 2 \cdot 2xB = -4x$$

$$4xB = -4x / : 4x$$

$$B = -1$$

$$(2x-1)^2 = 4x^2 - 4x + 1$$

dodajemo i oduzimamo 1

$4x^2 - 4x - 3 = 0$

$$\underbrace{4x^2 - 4x + 1} - 1 - 3 = 0$$

$(2x-1)^2 - 4 = 0$

$(2x-1)^2 - 2^2 = 0$

$(2x-1-2)(2x-1+2) = 0$

$(2x-3)(2x+1) = 0$

$$2x-3=0 \quad 2x+1=0$$

$$2x=3 / : 2 \quad 2x=-1 / : 2$$

$$x=\frac{3}{2} \quad x=-\frac{1}{2}$$

$$x_1=\frac{3}{2} \quad x_2=-\frac{1}{2}$$

Potpuno riješene zadatke iz:

- Kompleksnih brojeva
- Polinomi drugog stupnja
- Trigonometrije pravokutnog trokuta ...

i svih ostalih poglavlja iz školske zbirke potražite na [www.maat-fiiz.com](http://www.maat-fiiz.com)  
isto kao i rješenja

svih ostalih matematika za srednju školu: Mat-1, Mat-3, Mat-4

2.

$$1) 6x^2 - x - 2 = 0$$

$$a=6 \quad b=-1 \quad c=-2$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 6 \cdot (-2)}}{2 \cdot 6}$$

$$= \frac{1 \pm \sqrt{1 + 48}}{12}$$

$$= \frac{1 \pm \sqrt{49}}{12}$$

$$= \frac{1 \pm 7}{12}$$

$$x_1 = \frac{1-7}{12} \quad x_2 = \frac{1+7}{12}$$

$$x_1 = \frac{-6}{12} \quad x_2 = \frac{8}{12}$$

$$x_1 = -\frac{1}{2} \quad x_2 = \frac{2}{3}$$

$$2) 10x^2 + 3x - 4 = 0$$

$$a=10 \quad b=3 \quad c=-4$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 10 \cdot (-4)}}{2 \cdot 10}$$

$$= \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 160}}{20}$$

$$= \frac{-3 \pm \sqrt{169}}{20}$$

$$= \frac{-3 \pm 13}{20}$$

$$x_1 = \frac{-3-13}{20} \quad x_2 = \frac{-3+13}{20}$$

$$x_1 = \frac{-16}{20} \quad x_2 = \frac{10}{20}$$

$$x_1 = -\frac{4}{5} \quad x_2 = \frac{1}{2}$$

$$3) 27x^2 - 3x - 4 = 0$$

$$a=27 \quad b=-3 \quad c=-4$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \cdot 27 \cdot (-4)}}{2 \cdot 27}$$

$$= \frac{3 \pm \sqrt{9 + 432}}{54}$$

$$= \frac{3 \pm \sqrt{441}}{54}$$

$$= \frac{3 \pm 21}{54}$$

$$x_1 = \frac{3+21}{54} \quad x_2 = \frac{3-21}{54}$$

$$x_1 = \frac{24}{54} \quad x_2 = \frac{-18}{54}$$

$$x_1 = \frac{4}{9} \quad x_2 = -\frac{1}{3}$$

$$4) 5x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$a=5 \quad b=-2 \quad c=-3$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (-3)}}{2 \cdot 5}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{4 + 60}}{10}$$

$$= \frac{2 \pm \sqrt{64}}{10}$$

$$= \frac{2 \pm 8}{10}$$

$$x_1 = \frac{2-8}{10} \quad x_2 = \frac{2+8}{10}$$

$$x_1 = -\frac{6}{10} \quad x_2 = \frac{10}{10}$$

$$x_1 = -\frac{3}{5} \quad x_2 = 1$$

7. 5)

$$7) \underbrace{(a^2-b^2)}_a x^2 - \underbrace{4ab}_b x - \underbrace{(-a^2+b^2)}_c = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{4ab \pm \sqrt{16a^2b^2 - 4 \cdot (a^2-b^2) \cdot (-a^2+b^2)}}{2(a^2-b^2)}$$

$$= \frac{4ab \pm \sqrt{16a^2b^2 + 4(a^2-b^2) \cdot (a^2-b^2)}}{2(a^2-b^2)}$$

$$= \frac{4ab \pm \sqrt{16a^2b^2 + 4(a^2-b^2)^2}}{2(a^2-b^2)}$$

$$= \frac{4ab \pm \sqrt{16a^2b^2 + 4(a^4 - 2a^2b^2 + b^4)}}{2(a^2-b^2)}$$

$$= \frac{4ab \pm \sqrt{16a^2b^2 + 4a^4 - 8a^2b^2 + 4b^4}}{2(a^2-b^2)}$$

$$= \frac{4ab \pm \sqrt{4a^4 + 8a^2b^2 + 4b^4}}{2(a^2-b^2)}$$

$$= \frac{4ab \pm \sqrt{4(a^4 + 2a^2b^2 + b^4)}}{2(a^2-b^2)} = \frac{4ab \pm 2(a^2+b^2)}{2(a^2-b^2)}$$

$$6) \quad x_1 = \frac{4ab + 2(a^2+b^2)}{2(a^2-b^2)} = \frac{\cancel{2}(2ab + a^2 + b^2)}{\cancel{2}(a^2-b^2)} = \frac{a^2 + 2ab + b^2}{a^2 - b^2}$$

$$= \frac{(a+b)^2}{(a-b)(a+b)} = \frac{a+b}{a-b}$$

$$x_2 = \frac{4ab - 2(a^2+b^2)}{2(a^2-b^2)} = \frac{\cancel{2}(2ab - a^2 - b^2)}{\cancel{2}(a^2-b^2)} = \frac{-(a^2 - 2ab + b^2)}{(a-b)(a+b)}$$

$$= \frac{-(a-b)^2}{\cancel{(a-b)}(a+b)} = \frac{-(a-b)}{a+b} = \frac{-a+b}{a+b}$$

$$= \frac{-a+b}{a+b}$$

$$= -a+2b$$

8. 1)  $x^3 - 1 = 0$   
 $(x-1)(x^2 + x + 1) = 0$   
 $x-1=0$        $x^2 + x + 1 = 0$   
 $x_1 = 1$        $\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a & b & c \end{matrix}$

$$x_{2,3} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2}$$

$$x_{2,3} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$$

$x_1 = 1$        $x_{2,3} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}$

2)  $x^3 + 27 = 0$        $x^3 + 3^3 = 0$   
 $(x+3)(x^2 - 3x + 3^2) = 0$   
 $x+3=0$        $x^2 - 3x + 3^2 = 0$   
 $x_1 = -3$        $x^2 - 3x + 9 = 0$   
 $\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a & b & c \end{matrix}$

$$x_{2,3} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{3 \pm \sqrt{3^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{3 \pm \sqrt{9 - 36}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{-27}}{2} = \frac{3 \pm 3i\sqrt{3}}{2}$$

$x_1 = -3$        $x_{2,3} = \frac{3 \pm 3i\sqrt{3}}{2}$

3)  $m^3 - 64 = 0$        $m^3 - 4^3 = 0$   
 $(m-4)(m^2 + 4m + 16) = 0$   
 $m-4=0$        $m^2 + 4m + 16 = 0$   
 $m_1 = 4$        $\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a & b & c \end{matrix}$

$$m_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-4 \pm \sqrt{4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 16}}{2 \cdot 1}$$

$$= \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 64}}{2} = \frac{-4 \pm \sqrt{-48}}{2}$$

$$= \frac{-4 \pm \sqrt{-16 \cdot 3}}{2} = \frac{-4 \pm 4\sqrt{-3}}{2}$$

$$= \frac{\cancel{2}(-2 \pm 2\sqrt{-3})}{\cancel{2}} = -2 \pm 2\sqrt{-3}$$

$m_{2,3} = -2 + 2i\sqrt{3}$

$m_1 = 4$        $m_{2,3} = -2 + 2i\sqrt{3}$

## 2.3. Diskriminanta kvadratne jednačbe

$$\text{DISKRIMINANTA } D = b^2 - 4ac \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{kada je} \\ D > 0 \quad x_1, x_2 \text{ su različiti realni brojevi} \\ D = 0 \quad x_1 = x_2 \text{ isti realni brojevi} \\ D < 0 \quad x_1, x_2 \text{ su konjugirano kompleksni brojevi} \\ D \geq 0 \quad x_1, x_2 \text{ su realni brojevi} \end{array} \right.$$

### Primjeri:

1.)  $3x^2 - 2x + m = 0$

nema realna rješenja  
to znači da su rješenja konjugirano kompleksni brojevi pa je  $D < 0$

$$a = 3, b = -2, c = m$$

$$D < 0$$

$$b^2 - 4ac < 0$$

$$(-2)^2 - 4 \cdot 3 \cdot m < 0$$

$$4 - 12m < 0$$

$$-12m < -4 \quad / : (-12)$$

$$m > \frac{1}{3}$$

$$m > \frac{1}{3}$$

dakle za  $m > \frac{1}{3}$  nema realne korjene

2.)  $mx^2 - 6x + 1 = 0$  ima realne korjene  
→ to znači da je  $D \geq 0$

$$a = m, b = -6, c = 1$$

$$D \geq 0$$

$$b^2 - 4ac \geq 0$$

$$(-6)^2 - 4 \cdot m \cdot 1 \geq 0$$

$$36 - 4m \geq 0$$

$$-4m \geq -36 \quad / : (-4)$$

$$m \leq 9$$

dakle za  $m \leq 9$  jed. ima realne korjene

3.)  $2x^2 - (m-2)x - m = 0$

ima oba korjena realna i jednaka →  $D = 0$

$$a = 2, b = -(m-2), c = -m$$

$$D = 0$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$(-(m-2))^2 - 4 \cdot 2 \cdot (-m) = 0$$

$$(m-2)^2 + 8m = 0$$

$$m^2 - 4m + 4 + 8m = 0$$

$$m^2 + 4m + 4 = 0$$

$$(m+2)^2 = 0 \quad / \sqrt{\quad}$$

$$\sqrt{(m+2)^2} = 0$$

$$m+2 = 0$$

$$m = -2$$

dakle za  $m = -2$  oba korjena jednačbe su realna i jednaka

4.)  $2mx^2 - x - 1 = 0$

ima oba korijena realna i jednaka  
to znači da je  $D = 0$

$$a = 2m, b = -1, c = -1$$

$$D = 0$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$(-1)^2 - 4 \cdot 2m \cdot (-1) = 0$$

$$1 + 8m = 0$$

$$8m = -1 \quad / : 8$$

$$m = -\frac{1}{8}$$

za  $m = -\frac{1}{8}$  jed. ima oba korijena realna i jednaka

5.)  $x^2 - 2mx + 2 = 0$

nema realnih korijena  
to znači da je  $D < 0$

$$a = 1, b = -2m, c = 2$$

$$D < 0$$

$$b^2 - 4ac < 0$$

$$(-2m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 < 0$$

$$4m^2 - 8 < 0$$

$$4m^2 - 8 < 0 \quad / : 4$$

$$m^2 - 2 < 0$$

$$m^2 - \sqrt{2}^2 < 0$$

$$(m - \sqrt{2}) \cdot (m + \sqrt{2}) < 0$$

1.


$$m - \sqrt{2} > 0 \quad m + \sqrt{2} < 0$$

$$m > \sqrt{2} \quad m < -\sqrt{2}$$

2.

$$m - \sqrt{2} < 0 \quad m + \sqrt{2} > 0$$

$$m < \sqrt{2} \quad m > -\sqrt{2}$$



6.)  $x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$

ima realne i različite korjene  
to znači da je  $D > 0$

$$a = 1, b = -2m, c = m^2 - 1$$

$$D > 0$$

$$b^2 - 4ac > 0$$

$$(-2m)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (m^2 - 1) > 0$$

$$4m^2 - 4m^2 + 4 > 0$$

$4 > 0$  tvrdnja je istinita dakle za svaki  $m \in \mathbb{R}$  jednačba ima različite realne korjene  
jer  $D = 4$  za svaki  $m \in \mathbb{R}$  pa  $m$  nema utjecaj na vrijednost  $D$



1.

$$1.) \quad x^2 + 6x + 4 = 0$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a=1 & b=6 & c=4 \end{array}$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 4 = 36 - 16 = 20$$

$$\underline{D = 20}, \quad D > 0 \Rightarrow \text{RJEŠENJA SU REELNI / REALNI BROJEVI}$$

2.)

$$9x^2 + 3x + 5 = 0$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a=9 & b=3 & c=5 \end{array}$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot 9 \cdot 5 = 9 - 180$$

$$\underline{D = -171}, \quad D < 0 \Rightarrow \text{RJEŠENJA SU KONJUGIRANO KOMPLEKSNI BROJEVI}$$

3.)

$$4f^2 - 5f + 2 = 0$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ a=4 & b=-5 & c=2 \end{array}$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D = (-5)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 2$$

$$D = 25 - 32$$

$$D = -7, \quad D < 0 \Rightarrow \text{RJEŠENJA SU KONJUGIRANO KOMPLEKSNI BROJEVI}$$

čitatelj:  $\rightarrow D$  JE NIJE OD NILA

2.

$$1) \frac{x^2 + 4x + c = 0}{c = ?}$$

jednačba ima jednata rješenja

$$D = 0$$

$$D = b^2 - 4ac$$

$$x^2 + 4x + c = 0$$

$$a = 1 \quad b = 4 \quad c = c$$

$$b^2 - 4ac = 0$$

$$4^2 - 4 \cdot 1 \cdot c = 0$$

$$16 - 4c = 0$$

$$16 = 4c \quad /:4$$

$$c = 4$$

$$2) \frac{2x^2 - x + c = 0}{a = 2 \quad b = -1 \quad c = c}$$

Različita i realna rješenja

$$D > 0$$

$$D > 0$$

$$b^2 - 4ac > 0$$

$$(-1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot c > 0$$

$$1 - 8c > 0$$

$$-8c > -1 \quad /: (-8)$$

$$c < \frac{1}{8}$$

$$3) \frac{x^2 - 5x + c - 1 = 0}{a = 1 \quad b = -5 \quad c = c - 1}$$

Nema realnih rješenja

$$D < 0$$

$$D < 0$$

$$b^2 - 4ac < 0$$

$$(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (c - 1) < 0$$

$$25 - 4c + 4 < 0$$

$$29 - 4c < 0$$

$$29 < 4c \quad /:4$$

$$c > 7,25$$

## 2.4. Vieteove formule

Vieteove formule

za:

$$ax^2 + bx + c = \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} \end{cases}$$

Primjeri:

1.)  $3x^2 - 5x + 7 = 0$

$a = 3, b = -5, c = 7$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{-5}{3}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{7}{3}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{5}{3}$$

2.)  $x^2 - x + 110 = 0$

$a = 1, b = -1, c = 110$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{-1}{1}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{110}{1}$$

$$x_1 + x_2 = 1$$

$$x_1 \cdot x_2 = 110$$

4.)  $9x^2 + 11x - 1 = 0$

$a = 9, b = 11, c = -1$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{11}{9}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{-1}{9}$$

$$x_1 \cdot x_2 = -\frac{1}{9}$$

5.)  $5x^2 + x + 5 = 0$

$a = 5, b = 1, c = 5$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{1}{5}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{5}{5}$$

$$x_1 \cdot x_2 = 1$$

1.

$$1) 2x^2 - 3x + 1 = 0$$

$$a = 2 \quad b = -3 \quad c = 1$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{-3}{2} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{1}{2}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{3}{2}$$

$$2) 3x^2 + x - 2 = 0$$

$$a = 3 \quad b = 1 \quad c = -2$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{1}{3} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{-2}{3}$$

$$3) x^2 - x + 10 = 0$$

$$a = 1 \quad b = -1 \quad c = 10$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{-1}{1} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{10}{1}$$

$$x_1 + x_2 = 1 \quad x_1 \cdot x_2 = 10$$

$$4) 2x^2 - x - 2 = 0$$

$$a = 2 \quad b = -1 \quad c = -2$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{-1}{2} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{-2}{2}$$

$$x_1 + x_2 = \frac{1}{2} \quad x_1 \cdot x_2 = -1$$

5)

$$2x^2 + 10x - 10 = 0$$

$$a = 2 \quad b = 10 \quad c = -10$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{10}{2} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{-10}{2}$$

$$x_1 + x_2 = -5 \quad x_1 \cdot x_2 = -5$$

6)

$$4x^2 + 4x + 1 = 0$$

$$a = 4 \quad b = 4 \quad c = 1$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{4}{4} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{1}{4}$$

$$x_1 + x_2 = -1$$

Potpuno riješene zadatke iz:

- Kompleksnih brojeva
- Polinomi drugog stupnja
- Trigonometrije pravokutnog trokuta ...

i svih ostalih poglavlja iz školske zbirke potražite na [www.maat-fiiz.com](http://www.maat-fiiz.com) isto kao i rješenja

svih ostalih matematika za srednju školu: Mat-1 , Mat-3 , Mat-4

3.

$$3x^2 - x + 2 = 0$$

$$a = 3 \quad b = -1 \quad c = 2$$

$$1) \quad x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 \cdot x_2 = \left(-\frac{b}{a}\right)^2 - 2 \frac{c}{a} = \frac{b^2}{a^2} - 2 \frac{c}{a} = \frac{b^2}{a^2} - \frac{2c \cdot a}{a \cdot a} = \frac{b^2}{a^2} - \frac{2ac}{a^2} =$$

$$= \frac{b^2 - 2ac}{a^2} = \frac{(-1)^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2}{3^2} = \frac{1 - 12}{9} = -\frac{11}{9}$$

$$2) \quad \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_2 + x_1}{x_1 \cdot x_2} = \frac{-\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}} = -\frac{b \cdot a}{a \cdot c} = -\frac{b}{c} = -\frac{-1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$3) \quad x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1 \cdot x_2 \cdot (x_1 + x_2) = \left(-\frac{b}{a}\right)^3 - 3 \cdot \frac{c}{a} \cdot \left(-\frac{b}{a}\right) = -\frac{b^3}{a^3} + \frac{3bc}{a^2} =$$

$$= \frac{-b^3 + 3abc}{a^3} = \frac{3abc - b^3}{a^3} = \frac{3 \cdot 3 \cdot (-1) \cdot 2 - (-1)^3}{3^3} = \frac{-18 - (-1)}{27} = \frac{-18 + 1}{27} =$$

$$= -\frac{17}{27}$$

$$4) \quad \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1} = \frac{x_1 \cdot x_1 + x_2 \cdot x_2}{x_2 \cdot x_1} = \frac{x_1^2 + x_2^2}{x_1 \cdot x_2} = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 \cdot x_2}{x_1 \cdot x_2} = \frac{\left(-\frac{b}{a}\right)^2 - 2 \cdot \frac{c}{a}}{\frac{c}{a}} =$$

$$= \frac{\frac{b^2}{a^2} - \frac{2c}{a}}{\frac{c}{a}} = \frac{\frac{b^2 - 2ac}{a^2}}{\frac{c}{a}} = \frac{a(b^2 - 2ac)}{a^2 \cdot c} = \frac{b^2 - 2ac}{ac} =$$

$$= \frac{(-1)^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2}{3 \cdot 2} = \frac{1 - 12}{6} = -\frac{11}{6}$$

$$5) \quad x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2)^2 + (x_2^2)^2 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2x_1^2 \cdot x_2^2 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1 \cdot x_2)^2 =$$

$$= \left(\frac{b^2 - 2ac}{a^2}\right)^2 - 2\left(\frac{c}{a}\right)^2 = \left[\frac{(-1)^2 - 2 \cdot 3 \cdot 2}{3^2}\right]^2 - 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^2 =$$

$$= \left(\frac{1 - 12}{9}\right)^2 - 2 \cdot \frac{4}{9} = \left(-\frac{11}{9}\right)^2 - \frac{8}{9} = \frac{121}{81} - \frac{8}{9} = \frac{121 - 72}{81} = \frac{49}{81}$$

16.

$$p(x-1)^2 = 2p-1$$

$$p \in \mathbb{R} \quad p \neq 0$$

$$p(x^2 - 2x + 1) = 2p - 1$$

$$px^2 - 2px + p - 2p + 1 = 0$$

$$px^2 - 2px - p + 1 = 0$$

$$a = p \quad b = -2p \quad c = 1 - p$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-2p}{p} = 2$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{1-p}{p}$$

1) jednačba ima realne korijene  $\Rightarrow D \geq 0$

$$D = b^2 - 4ac \geq 0$$

$$(-2p)^2 - 4 \cdot p \cdot (1-p) \geq 0$$

$$4p^2 - 4p + 4p^2 \geq 0$$

$$8p^2 - 4p \geq 0 \quad /: 4$$

$$2p^2 - p \geq 0$$

$$p(2p-1) \geq 0$$


$$p = 0$$

$$p_1 = 0$$

$$2p-1 \geq 0$$

$$2p = 1 \quad /: 2$$

$$p = \frac{1}{2}$$



$$p \in \langle -\infty, 0 \rangle \cup \left[ \frac{1}{2}, \infty \right)$$

2) zbroj kubova rješenja jednačbe jednak je pet

$$x_1^3 + x_2^3 = 5$$

$$x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1 \cdot x_2 (x_1 + x_2) = 2^3 - 3 \cdot \frac{1-p}{p} \cdot 2 = 8 - 6 \frac{1-p}{p} = 8 - \frac{6-6p}{p}$$

$$8 - \frac{6-6p}{p} = 5 \quad /: p$$

$$8p - (6-6p) = 5p$$

$$8p - 6 + 6p = 5p$$

$$8p + 6p - 5p = 6$$

$$9p = 6 \quad /: 9$$

$$p = \frac{6}{9} \Rightarrow p = \frac{2}{3}$$

3) razlika rješenja jednačbe jednaka je 3

$$x_1 - x_2 = 3$$

$$x_1 = 3 + x_2$$

$$x_1 + x_2 = 2$$

$$3 + x_2 + x_2 = 2$$

$$3 + 2x_2 = 2$$

$$2x_2 = 2 - 3$$

$$2x_2 = -1 \quad /: 2$$

$$x_2 = -\frac{1}{2}$$

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{1-p}{p}$$

$$(3 + x_2) \cdot x_2 = \frac{1-p}{p}$$

$$\left(3 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1-p}{p}$$

$$\frac{6-1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1-p}{p}$$

$$-\frac{5}{4} = \frac{1-p}{p} \quad /: 4p$$

$$-5p = 4(1-p)$$

$$-5p = 4 - 4p$$

$$-5p + 4p = 4$$

$$-p = 4 \quad /: (-1)$$

$$p = -4$$

Ovo **NISU SVI zadaci**, već naš izbor pojedinih zadataka iz naše skripte potpuno riješenih zadataka iz poglavlja KVADRATNE jednadžbe po školskoj zbirci ! – ( za gimnazije )  
cijelu skriptu o KVADRATNIM JEDNADŽBAMA potpuno riješenih zadataka po školskoj zbirci možete kupiti kod nas - po cijeni od 99 kn  
narudžbe na mail: [mim-sraga@zg.htnet.hr](mailto:mim-sraga@zg.htnet.hr) ili na 01-4578-431 ili [www.maat-fiiz.com](http://www.maat-fiiz.com)

28.

Zadana jednadžba  $3x^2 - 2x + 7 = 0$ 

$$a = 3, b = -2, c = 7$$

Rješenja nove jednadžbe označimo sa  $y_1$  i  $y_2$  → zadano je:  $y_1 = \frac{1}{x_1}, y_2 = \frac{1}{x_2}$

Nova kvadratna jednadžba je ovog oblika:

$$x^2 - (y_1 + y_2) \cdot x + (y_1 \cdot y_2) = 0$$

$$x^2 - \left( \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} \right) \cdot x + \left( \frac{1}{x_1} \cdot \frac{1}{x_2} \right) = 0$$

$$x^2 - \left( \frac{x_2 + x_1}{x_1 \cdot x_2} \right) \cdot x + \left( \frac{1}{x_1 \cdot x_2} \right) = 0 \rightarrow \text{uvrsti } x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

$$x^2 - \left( \frac{-\frac{b}{a}}{\frac{c}{a}} \right) \cdot x + \frac{1}{\frac{c}{a}} = 0 \rightarrow \text{pokradi}$$

$$x^2 + \frac{b}{c} \cdot x + \frac{a}{c} = 0$$

$$x^2 + \frac{-2}{3} \cdot x + \frac{7}{3} = 0 \quad / \cdot 3$$

$$3x^2 - 2x + 7 = 0$$

29.

Zadana je jednažba  $x^2 - 6x + 5 = 0$ 

$$a = 1, b = -6, c = 5$$

Rješenja nove jednadžbe označimo sa  $y_1$  i  $y_2$  → zadano je:  $y_1 = x_1 + 3, y_2 = x_2 + 3$

$$y_1 + y_2 = x_1 + 3 + x_2 + 3 = x_1 + x_2 + 6 = -\frac{b}{a} + 6 = -\frac{-6}{1} + 6 = 6 + 6 = 12$$

$$y_1 + y_2 = 12$$

$$y_1 \cdot y_2 = (x_1 + 3)4(x_2 + 3) = x_1x_2 + 3x_1 + 3x_2 + 9 = x_1x_2 + 3(x_1 + x_2) + 9 =$$

$$= \frac{c}{a} + 3 \cdot \left( -\frac{b}{a} \right) + 9 = \frac{5}{1} + 3 \cdot \left( -\frac{-6}{1} \right) + 9 = 5 + 18 + 9 = 32$$

$$y_1 \cdot y_2 = 32$$

Nova kvadratna jednadžba je ovog oblika:

$$x^2 - (y_1 + y_2) \cdot x + (y_1 \cdot y_2) = 0 \rightarrow \text{uvrstimo već izračunato: } y_1 + y_2 = 12, y_1 \cdot y_2 = 32$$

$$x^2 - 12x + 32 = 0$$



Ovo je 15 stranica kompletno riješenih zadataka  
 iz naše ZBIRKE POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA –MATEMATIKA-2-  
**KVADRATNA JEDNADŽBA**  
 PO ŠKOLSKOJ ZBIRCI od B.Dakića --najnovije izdanje

U toj zbirci su riješeni svi zadaci  
 iz poglavlja br. **2. KVADRATNE JEDNADŽBE**  
na 150-stranica A-4 –formata

Dakle to je knjiga od 150 strana A-4 format

Ako trebate sva rješenja iz tog poglavlja možete ih naručiti tj. kupiti kod nas  
 Cijena te zbirke potpuno riješenih zadataka je 100 kn tj. Kao tri sata instrukcija  
 Specijalna ponuda za kupnju ove zbirke preko web-stranice ili ovog dokumenta  
 Vrijedi do daljnjeg i cijena je **75 kn + poštarina**

Kupnjom ove zbirke od nas dobivate i garanciju da su svi zadatci točno riješeni  
 i ako vam nešto nije jasno i trebate dodatne upute njih uvijek možete dobiti preko maila ili preko  
 telefona.

Ova zbirka je izdana **kao interna skripta zadataka** u okviru programa poduke i dopisne poduke  
 centra za poduku MiM-Sraga i nije u slobodnoj prodaji već se može kupiti isključivo u centru za  
 poduku u okviru specijalnog programa za ubranu poduku.

Sve narudžbe možete napraviti na mail: [mim-sraga@zg.htnet.hr](mailto:mim-sraga@zg.htnet.hr) ili telefon 01-4578-431

na [www.maat-fiiz.com](http://www.maat-fiiz.com)  
 potražite kompletno riješene zadatke  
 iz [MATEMATIKE –1](#) po školskim zbirkama  
 iz [MATEMATIKE –2](#) po školskim zbirkama  
 - Kompleksni brojevi  
 - Kvadratna jednadžba  
 - Polinomi drugog stupnja  
 - [Trigonometrija pravokutnog trokuta](#)

**[MATEMATIKA –3](#)**  
 po školskim zbirkama  
 TRIGONOMETRIJA  
 VEKTORI  
 KRUŽNICA  
 ELIPSA  
 HIPERBOLA  
 PARABOLA

